

CINTILOGRAFIA COM ANÁLOGO DA SOMATOSTATINA **(PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM OCTREOTIDE)**

Radiofármaco: Octreo-^{99m}Tc

Duração: tempo de duração do exame de aproximadamente 5 horas (imagens com 2 horas e 4 horas após a injeção). Não é necessária a permanência do paciente na Medicina Nuclear durante o intervalo entre as imagens.

Como o exame é realizado: Após 2 horas e 4 horas a administração endovenosa do radiofármaco serão realizadas imagens do corpo inteiro com duração de aproximadamente 60 minutos cada.

Preparo do paciente:

- Deve ser considerado descontinuar a terapia com octreotide ou octreotato antes da administração do radiofármaco:
 - Sandostatina via oral (octreotídeo frio) - suspender 48 horas antes do exame.
 - Sandostatina de depósito (longa duração) - suspender 3 semanas antes do estudo ou marcar o exame dias antes da próxima dose. (confirmar possibilidade de suspensão com o médico responsável).
- Necessário jejum de 2 horas.

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia, laboratoriais, tomografia, radiografia e ressonância magnética relacionados à condição clínica.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	