

CINTILOGRAFIA DE NECROSE CARDÍACA

Radiofármaco: PIROFOSFATO - 99mTc

<u>Duração:</u> aproximadamente 5 horas.

<u>Como o exame é realizado:</u> É administrado o radiofármaco no paciente por via intravenosa. O paciente deverá aguardar um intervalo de aproximadamente 3 horas para que o medicamento se distribua em todo o corpo. Após esse intervalo é iniciado a aquisição de imagem, que tem duração de aproximadamente 30 minutos. Pode ser solicitado imagem de 5 horas após administração do radiofármaco.

Preparo do paciente:

• JEJUM: não é necessário.

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Paciente abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão trazer no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	