

## CINTILOGRAFIA DE FÍGADO E BAÇO

**Radiofármaco:** Coloide –  $^{99m}\text{Tc}$

**Duração:** aproximadamente 60 minutos.

**Como o exame é realizado:** É administrado por via intravenosa o radiofármaco. As imagens serão adquiridas aproximadamente 10 a 20 minutos após a administração do medicamento. Serão adquiridas imagens estáticas em várias projeções do abdome, além da aquisição tomográfica (SPECT). O tempo aproximado de aquisição é de 20 a 30 minutos.

---

### Preparo do paciente:

- JEJUM: não é necessário.

### Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Paciente abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão trazer no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

<b>CAPACIDADE DE CARGA</b>	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	