

CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE DIVERTÍCULO DE MECKEL

Radiofármaco: PERTECNETATO – ^{99m}Tc

Duração: Aproximadamente 1 hora e 30 minutos.

Como o exame é realizado: Com o paciente posicionado no aparelho, o radiofármaco é administrado na veia do paciente e se inicia a aquisição das imagens com duração de aproximadamente 1 hora.

Preparo do paciente:

- Jejum de 06 horas, exceto água.
 - Não é necessário suspensão de medicamentos de uso diário
 - A critério do médico, poderá ser feito preparo com ranitidina ou cimetidina:
 - Crianças: Ranitidina 2 a 4 mg/kg/dia, por via oral, divididos em 2x/dia, por 2 dias antes do exame;
 - Adultos: Cimetidina 400 a 800 mg/dia, por via oral, por 2 dias antes do exame.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia, ultrassonografia, tomografia, ressonância e laboratoriais relacionados à condição clínica.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	