

CINTILOGRAFIA DE NECROSE CARDÍACA

Radiofármaco: PIROFOSFATO – ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 5 horas.

Como o exame é realizado: Na sala de espera é administrado por via intravenosa o primeiro radiofármaco, sendo necessário aguardar 20-30 minutos. Outro radioisótopo será administrado em um segundo acesso venoso periférico. A aquisição das imagens será realizada após a segunda injeção. Tempo aproximado da aquisição das imagens de 30 a 60 minutos.

Preparo do paciente:

- JEJUM: não é necessário.
- O paciente deverá suspender, sob autorização do médico solicitante, os seguintes medicamentos: hidralazina, prazosin, propranolol, digoxina, dextrose, doxorrubicina, contraste com iodo, metildopa, quinidina, heparina, solução glicosada, penicilina.

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Paciente abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão trazer no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	