

CINTILOGRAFIA ÓSSEA (CORPO TOTAL)

Radiofármaco: MDP – ^{99m}Tc

Duração: A duração do exame pode variar de 4 a 6 horas.

Obs.: Não é necessário a permanência na clínica de Medicina Nuclear entre a injeção e a imagem tardia. Durante este tempo você poderá se ausentar ou permanecer na sala de espera se assim o preferir.

Como o exame é realizado: O radiofármaco é administrado por via endovenosa. Em seguida é necessário aguardar um período de pelo menos 3 horas para que o radiotraçador se concentre nos ossos e possibilite a aquisição das imagens de corpo inteiro (duração de aproximadamente 40 minutos).

- Durante o intervalo entre a administração do radiotraçador e a aquisição das imagens é orientado que o paciente se hidrate bem, com no mínimo 8 copos de água, ao menos que exista contraindicação médica.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum ou suspensão de medicamentos de uso diário.
- Exames que utilizam contraste iodado, tais como tomografia computadorizada, PET/CT, entre outros, devem ser agendados e realizados com no mínimo 48 horas de intervalo entre a cintilografia.

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia, tomografia, radiografia e ressonância magnética relacionados à condição clínica.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes quem fazem uso de fralda, deverão levar no dia do exame fraldas extras.
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	