

## CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA OU INDIRETA

**Radiofármaco:** Coloide –  $^{99m}\text{Tc}$

**Duração:** aproximadamente 60 minutos.

**Como o exame é realizado:** Na *Cistocintilografia Direta*, será inicialmente feita uma sondagem vesical em ambiente estéril para a infusão do radiofármaco e volume variável de solução fisiológica. A aquisição inicia-se com o enchimento vesical e termina até a completa micção. O tempo da aquisição das imagens é variável, podendo durar de poucos minutos a algumas horas, dependendo das limitações de cada paciente. Na *Cistocintilografia Indireta*, o procedimento é praticamente idêntico à Cintilografia Renal Dinâmica, adicionando-se imagens sequenciais obtidas durante a micção. O tempo aproximado da aquisição das imagens também é de 45-60 minutos.

---

### Preparo do paciente:

- **JEJUM:** não é necessário.
- Na pesquisa de Hipertensão Renovascular, o paciente deverá suspender Bloqueadores de Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) por 3 a 7 dias, conforme orientação do médico nuclear.
- Hidratação abundante é recomendada, ingerir nos 60 minutos que antecedem à realização do exame 250mL de 15 em 15 minutos.

---

### Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão levar no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

<b>CAPACIDADE DE CARGA</b>	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	