

## **TRATAMENTO DO HIPERTIREOIDISMO – BÓCIO NODULAR TÓXICO (DOENÇA DE GRAVES)**

**Radiofármaco:**  $^{131}\text{I}$ odo

**Duração:** 2 etapas: sessão médica e dose terapêutica.

---

**Como o procedimento é realizado:** O paciente passará por uma consulta com o médico nuclear, que definirá a dose a ser administrada e passará as orientações de preparo e radioproteção. Nessa entrevista o paciente deverá levar consigo exames prévios relacionados à tireoide, como a cintilografia da tireoide. O tratamento compreende a administração de iodo radioativo por via oral. O paciente aguardará o tempo necessário para a monitoração da taxa de exposição e posteriormente será liberado para casa.

### **Preparo do paciente:**

- Dieta e suspensão de medicamentos será passada pelo médico nuclear durante a realização da sessão médica;
  - No dia do exame: jejum de no mínimo 2 horas;
  - Depois a administração do radiofármaco, permanecer em jejum por mais 2 horas;
  - Retornar a dieta normal, após 24 horas da administração do radiofármaco.
- 

### **Informações Gerais:**

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia, laboratoriais, tomografia, radiografia e ressonância magnética relacionados à condição clínica.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.
- Este exame é realizado somente com solicitação médica.
- O procedimento não é feito em gestantes nem em mulheres que estejam amamentando.
- Para mulheres em idade fértil, é necessário fazer a coleta do exame beta-HCG até 7 dias antes do tratamento.
- Ao agendar o tratamento, o paciente precisa informar os nomes de medicamentos e de antissépticos usados nos últimos 90 dias, para que sejam verificados os prazos de suspensão. Se o medicamento for estrangeiro ou fórmula, é necessário fornecer os nomes dos componentes. Entretanto, a interrupção de qualquer medicamento deve ter ordem expressa do médico assistente.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

<b>CAPACIDADE DE CARGA</b>	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	